

レジメン名	アドリアシン膀胱腔内注入法
対症疾患（癌種）	膀胱腫瘍
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 初発 <input checked="" type="checkbox"/> 進行再発 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> その他

No.	薬剤（商品名）	投与量（基準値）	投与方法	投与ルート	投与時間速度	投与日（Day●）	投与上の注意点
	アドリアシン注用 （ドキシソルビシン・DXR） 製剤規格：10mg、50mg	30～60mg	左記用量で、1～2mg/mLに溶解し、1日1回膀胱注入			連日または週2～3回	
	生食	20～40mL					
	【膀胱腔内注入法】 ネラトンカテーテルで導尿し、十分に膀胱腔内を空にしたのち同カテーテルより、上記ドキシソルビシンの生食溶液を膀胱腔内に注入し、1～2時間膀胱把持する。						
備考							

インターバル日数（1コース期間）	規定なし
総コース数	規定なし

投与中止・延期・減量基準（別紙添付可）	萎縮膀胱：投与中止
主な副作用	承認時及び副作用頻度調査において、919例中、膀胱刺激症状（33.9%）、発熱（1.2%）、食欲不振（1.1%）、白血球減少（1.0%）、萎縮膀胱（0.9%）、残尿感（0.9%）、脱毛（0.9%）

レジメン解説 エビデンス資料 （国内で承認された用法・用量並びに投与経路が異なる場合は必須）	添付文書上の適応あり。
--	-------------