

レジメン名	ABVD療法
対症疾患（癌種）	悪性リンパ腫（ホジキンリンパ腫）
適応分類	<input type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> その他

投与薬剤（支持療法薬剤も記入）						
No.	薬剤（商品名・一般名）	1回投与量	溶解液・用量	投与方法	投与時間	投与日（d1,d8 など）
1	イメンド内服	d1, 15は120mg d2, 3, 16, 17は80mg				d1, 2, 3, 15, 16, 17
2	生食500ml ルートキープ			[メイン] 点滴静注		d1, 15
3	アロキシ デキサート	0.75mg 9.9mg	1バッグ	[側管] 点滴静注	10分	d1, 15
7	ダカルバジン（要遮光）	375mg/m ²	5%ブドウ糖液 100ml	[側管] 点滴静注	30分 調整から15分以内に点滴開始	d1, 15
4	アドリアシン	25mg/m ² (総投与量は 500mg/m ² 以下)	生食100ml	[側管] 点滴静注	30分	d1, 15
5	ブレオ	9mg/m ² (max15mg)	生食100ml	[側管] 点滴静注	30分	d1, 15
6	エクザール	6mg/m ² (max10mg)	生食50ml	[側管] 点滴静注	10分	d1, 15

投与間隔（1コース期間）	28日（2週間毎の投与となるが、Day1-28を1コースとする）
総コース数	6-8コース
主な副作用	悪心、血管痛、感染症、脱毛、間質性肺炎、骨髄抑制