

レジメン名	R-THPCOP
対症疾患（癌種）	悪性リンパ腫（B細胞性非ホジキンリンパ腫）
適応分類	<input type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input checked="" type="checkbox"/> その他

投与薬剤（支持療法薬剤も記入）						
No.	薬剤（商品名・一般名）	1回投与量	溶解液・用量	投与法	投与時間	投与日 (d1,d8 など)
1	タリオン	10mg 1錠		内服	30分前	d1
2	スリノフェン	60mg 1錠		内服	30分前	d1
3	リツキサソ	375mg/m <sup>2</sup>	生食500ml	点滴静注	25mg/h～	d1
4	グラニセトロン	3mg		点滴静注	30分	d1
5	テラルビシン	50mg/m <sup>2</sup>	生食100ml	点滴静注	30分	d1
6	オンコビン	1.4mg/m <sup>2</sup> (max 2mg)	生食50ml	点滴静注	10分	d1
7	エンドキサソ	750mg/m <sup>2</sup>	生食500ml	点滴静注	2時間	d1
8	プレドニン	100mg		内服(分3)		d1-d5

投与間隔（1コース期間）	21日
総コース数	3-8コース
主な副作用	悪心、便秘、感染症、吃逆、脱毛、末梢神経障害、骨髄抑制、infusion reaction