

レジメン名	BR療法
対症疾患（癌種）	悪性リンパ腫
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 初発 <input type="checkbox"/> 進行・再発 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> その他

投与薬剤（支持療法薬剤も記入）						
No.	薬剤（商品名・一般名）	1回投与量	溶解液・用量	投与方法	投与時間	投与日 (d1,d8 など)
1	抗アレルギー剤（ベポタスチン等）	10mg 1錠		内服	リツキサンの30分前	d1
2	解熱鎮痛剤（ロキソプロフェン等）	60mg 1錠		内服	リツキサンの30分前	d1
3	アロキシ点滴静注バッグ	0.75mg/50mL		点滴静注	15分	d1
4	デキサート注	3.3mg	生食50ml	点滴静注	15分	d1-2
5	トレアキシ点滴静注用	90mg/m ²	生食250ml	点滴静注	60分	d1-2
6	リツキサン注	375mg/m ²	生食 1mg/mLに希釈	点滴静注	25mg/h～	d1
7						

投与間隔（1コース期間）	28日
総コース数	3-8コース
主な副作用	悪心、嘔吐、感染症、血管痛、骨髄抑制、infusion reaction