

レジメン名	アバスチン+XELOX
対症疾患（癌種）	切除不能進行再発大腸癌
適応分類	<input checked="" type="checkbox"/> 進行再発 <input type="checkbox"/> 術後化学療法 <input type="checkbox"/> 術前化学療法 <input type="checkbox"/> その他

投与薬剤（支持療法薬剤も記入）

No.	薬剤（商品名・一般名）	1回投与量 溶解液用量	投与方法	投与時間	投与日 (d1,d8 など)
1	生食（ルートキープ）				d1
2	アロキシ	0.75mg/50mL	点滴静注	15分	d1
	デキサート	6.6mg			
	ポララミン注	5mg			
	ガスター注	20mg			
3	アバスチン	7.5mg/kg	点滴静注	初回90分→60分 →30分(※1)	d1
	生食	100mL			
4	エルプラット	130mg/m ²	点滴静注	2時間	d1
	5%ブドウ糖液	250mL			
5	1の生食でフラッシュ				
6	カペシタビン錠（ゼローダ）	(※2)	内服	1日2回朝夕食後	d1夕-15朝 (14日間服用、7日間休薬)

※1) アバスチンは、初回投与時間90分、忍容性がよければ、2回目60分→3回目以降30分に短縮可。

※2) ゼローダの投与量

体表面積	1回用量	1日用量
1.36m ² 未満	1200mg (4錠)	2400mg (8錠) / 2 ×
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1500mg (5錠)	3000mg (10錠) / 2 ×
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1800mg (6錠)	3600mg (12錠) / 2 ×
1.96m ² 以上	2100mg (7錠)	4200mg (14錠) / 2 ×

投与間隔（1コース期間）	3週間毎
総コース数	PDまで
主な副作用	末梢神経症状93.8%、食欲不振89.1%、疲労81.3%、悪心76.6%、手足症候群76.6%、色素沈着59.4%、下痢56.3%、口内炎54.7%、好中球減少51.6%、嘔吐42.2%[進行・再発結腸直腸癌を対象とした第I/II相臨床試験(J019380試験)]